

園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
 感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、
 一人ひとりの子どもが一日快適に生活できるよう、
 上記の感染症については、登園のめやす（裏面）を参考に、
 かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。

登園のめやす（感染症とその出席停止期間）

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹 (はしか)	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過していること
インフルエンザ	症状がある期間（発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い）	乳幼児 発症した後5日経過し、 かつ解熱した後3日経過していること
風しん	発しん出現の7日前から7日後くらい	発しんが消失していること
水痘 (みずぼうそう)	発しん出現1～2日前から 痂皮（かさぶた）形成まで	すべての発しんが痂皮（かさぶた）化していること
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が 発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること
咽頭結膜炎 (プール熱)	発熱、充血等の症状が出現した数日間	発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること
流行性角結膜炎 (はやり目)	充血、目やに等の症状が出現した数日間	結膜炎の症状が消失していること
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること

0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白
黒	グレー	グレー	グレー	グレー	グレー	黒	白	白	白

インフルエンザについては、最短でも、発症後6日目からの登園になります